

Rec'd PCT

INPI

SEP 2004

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

REC'D 30 JUN 2003

WIPO

PCT

BREVET D'INVENTION


CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 03 AVR. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets



Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01


REQUÊTE EN DELIVRANCE 1/2

Important ! Remplir impérativement la 2ème page.

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 190600

REMISE DES PIÈCES DATE 3 AVRIL 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0204158 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 03 AVR. 2002 PAR L'INPI		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE Monsieur Jacques LUDWIG SANOFI-SYNTHELABO Département Brevets 174 avenue de France 75013 PARIS FRANCE	
Vos références pour ce dossier (facultatif) SSL0065/JL			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	N°
Demande de brevet initiale		N°	Date
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Dérivés de 3-hétéroaryl-3,5-dihydro-4-oxo-4H-pyridazino[4,5-b]indole-1-acétamide, Leur Préparation et Leur Application en Thérapeutique			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		SANOFI-SYNTHELABO	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	174 Avenue de France	
	Code postal et ville	75013	PARIS
Pays		FRANCE	
Nationalité		FRANCAISE	
N° de téléphone (facultatif)		01 41 24 12 56	
N° de télécopie (facultatif)		01 41 24 12 66	
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DES PIÈCES DATE 3 AVRIL 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0204158 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	DB 540 W / 120600
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		SSL0065/JL	
6 MANDATAIRE			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société			
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):</i>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», Indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Monsieur Jacques LUDWIG P.G. 9395		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

DERIVES DE 3-hétéroaryl-3,5-dihydro-4-oxo-4H-pyridazino[4,5-b]indole-1-acétamide,
LEUR PREPARATION ET LEUR APPLICATION EN THERAPEUTIQUE.

- 5 L'invention a pour objet des composés dérivés de 3-hétéroaryl-3,5-dihydro-4-oxo-4H-pyridazino[4,5-b]indole-1-acétamide.

On connaît déjà des composés dérivés de 3,5-dihydropyridazino[4,5-b]indole, décrits dans le document WO-A-0044384, affins *in vitro* pour les récepteurs de type

10 périphérique aux benzodiazépines (sites p ou PBR).

Il existe toujours une nécessité de trouver et de développer des produits présentant une bonne activité *in vivo*.

L'invention répond à ce but en proposant des composés nouveaux, qui présentent une affinité *in vitro* et *in vivo* pour les récepteurs de type périphérique aux benzodiazépines.

15


Un premier objet de l'invention concerne les composés répondant à la formule générale (I) ci-après.

Un autre objet de l'invention concerne des procédés de préparation des composés de formule générale (I).

- 20 Un autre objet de l'invention concerne des composés utilisables notamment en tant qu'intermédiaires de synthèse des composés de formule générale (I).

Un autre objet de l'invention concerne les utilisations des composés de formule générale (I) notamment dans des médicaments ou dans des compositions pharmaceutiques.

- 25 Les composés de l'invention répondent à la formule générale (I) :



dans laquelle

X représente un atome d'hydrogène ou d'halogène,

R₁ représente un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle,

- 30 R₂ et R₃ représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle, ou bien R₂ et R₃ forment, avec l'atome d'azote qui les porte, un groupe pyrrolidinyle, pipéridinyle, morpholinyle ou 4-(C₁-C₄)alkylpipérazinyle, et

Het représente un groupe hétéroaromatique de type pyridinyle, quinolinyle, isoquinolinyle, pyrimidinyle, pyrazinyle, pyridazinyle, le groupe hétéroaromatique pouvant porter un ou plusieurs atomes d'halogènes et/ou un ou plusieurs groupes (C₁-C₄)alkyle, (C₁-C₄)alcoxyle.

5

Les composés de l'invention peuvent exister à l'état de bases ou de sels d'addition à des acides. De tels sels d'addition font partie de l'invention.

Ces sels sont avantageusement préparés avec des acides pharmaceutiquement acceptables, mais les sels d'autres acides utiles, par exemple, pour la purification ou
10 l'isolement des composés de formule (I) font également partie de l'invention.

Les composés de formule (I) peuvent également exister sous forme d'hydrates ou de solvats, à savoir sous forme d'associations ou de combinaisons avec une ou plusieurs molécules d'eau ou avec un solvant. De tels hydrates et solvats font également partie de
15 l'invention.

Dans le cadre de la présente invention :

- un atome d'halogène représente un fluor, un chlore, un brome ou un iode ;
- un groupe (C₁-C₄)alkyle représente un groupe aliphatique, comportant de 1 à 4 atomes
20 de carbone, saturé linéaire ou ramifié. A titre d'exemples, on peut citer les groupes méthyle, éthyle, propyle, isopropyle, butyle, isobutyle, terbutyle ;
- un groupe (C₁-C₄)alcoxyle représente un radical oxygène, comportant de 1 à 4 atomes de carbone, substitué par un groupe alkyle tel que défini précédemment.

25 Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, des composés préférés sont les composés pour lesquels

X représente un atome d'halogène ; et/ou

R₁ représente un (C₁-C₄)alkyle ; et/ou

R₂ et R₃ représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un groupe (C₁-C₄)alkyle, ou bien R₂ et R₃ forment, avec l'atome d'azote qui les porte, un groupe pyrrolidinyle, ou
30 4-(C₁-C₄)alkylpipérazinyle ; et/ou

Het représente un groupe hétéroaromatique de type pyridinyle pouvant porter un ou plusieurs atomes d'halogène et/ou un ou plusieurs groupes (C₁-C₄)alkyle, (C₁-C₄)alcoxyle.

35

Des composés pour lesquels à la fois X, R₁, R₂, R₃ et Het sont tels que définis ci-dessus dans les sous-groupes de composés préférés, sont particulièrement préférés et plus spécifiquement parmi ceux-ci les composés pour lesquels :

X représente un atome de chlore, R₁ représente un groupe méthyle.


Parmi les composés de formule (I) objets de l'invention, à titre d'exemple, des composés de l'invention sont les suivants :

- 1 : 7-fluoro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(pyridin-2-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acetamide
- 5 2 : chlorhydrate de 7-fluoro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(pyridin-3-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acetamide (1 :1)
- 3 : chlorhydrate de 7-fluoro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(pyridin-4-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acetamide (1 :1)
- 10 4 : 7-chloro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(pyridin-2-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acetamide
- 5 : 7-chloro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(pyridin-3-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acetamide
- 6 : chlorhydrate de 7-chloro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(pyridin-3-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acetamide (1 :1)
- 15 7 : chlorhydrate de 7-chloro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(pyridin-4-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acetamide (1 :1)
- 8 : 7-chloro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(6-méthylpyridin-3-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acetamide
- 20 9 : 7-chloro-*N,N*-diéthyl-5-méthyl-4-oxo-3-(pyridin-3-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acetamide
- 10 : chlorhydrate de 4-méthyl-1-[2-[7-chloro-5-méthyl-3-(pyridin-3-yl)-4-oxo-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indol-1-yl]acet-1-yl]pipérazine (1:1)
- 11 : 1-[2-[7-chloro-5-méthyl-3-(pyridin-3-yl)-4-oxo-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indol-1-yl]acet-1-yl]pyrrolidine
- 25 12 : chlorhydrate de 1-[2-[7-chloro-5-méthyl-3-(pyridin-4-yl)-4-oxo-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indol-1-yl]acet-1-yl]pyrrolidine (1:1)

Les composés de formule générale (I) peuvent être préparés par des procédés illustrés dans ce qui suit.

Dans toute la suite de la description, les composés intermédiaires (II), (III), (IV) et (V) sont ceux présentés dans le schéma ci-après.

Schéma



Un composé de formule générale (II), dans laquelle X et R₁ sont tels que définis ci-dessus et R' représente un groupe (C₁-C₄)alkyle, est traité avec un 3-chloro-3-oxopropanoate de formule générale ClCOCH₂CO₂R'', dans laquelle R'' représente un
 5 groupe (C₁-C₄)alkyle, dans un solvant tel que le dichloroéthane, à température ambiante, en présence d'un acide de Lewis, par exemple le tétrachlorure de titane, pour obtenir le diester de formule générale (III).

La fonction cétoester du diester de formule générale (III) est transformée en cétoamide pour donner le composé de formule générale (IV) par action d'une amine de formule

générale HNR_2R_3 , dans laquelle R_2 et R_3 sont tels que définis ci-dessus, en présence d'un catalyseur comme la 4-(diméthylamino)pyridine.

Selon une première voie de préparation, le composé de formule générale (IV) est traité dans un solvant polaire en présence d'acide, avec une hétéroarylhydrazine, pour obtenir un amide de formule générale (I).


Selon une deuxième voie de préparation, le composé de formule générale (IV) est traité avec de l'hydrazine en chauffant dans un solvant comme le toluène en présence d'une quantité catalytique d'acide pour obtenir un pyridazinoindole de formule générale (V).
Finalement, une réaction de *N*-arylation est effectuée sur le pyridazinoindole de formule générale (V) en présence d'un halogénure d'hétéroaryle, ou bien d'un dérivé d'acide hétéroarylboronique et d'un sel métallique tel que un sel de cuivre conduisant à un composé de formule générale (I).

Les réactifs employés ci-dessus sont disponibles dans le commerce ou décrits dans la littérature, ou bien peuvent être préparés selon des méthodes qui y sont décrites ou qui sont connues de l'Homme du métier.

Plus particulièrement, les dérivés d'acides boroniques portant un groupe hétéroaromatique peuvent être préparés par des méthodes analogues à celles connues dans la littérature (*Synth. Commun.* 1996, 26, 3543 et WO9803484).

La préparation des composés de départ de formule générale (II) est décrite dans le document WO-A-0044751 dans le cas où X est un atome de chlore. Dans le cas où X est un atome de fluor, le composé de formule générale (II) est préparé de façon analogue à partir du 6-fluoroindole-2-carboxylate de méthyle, décrit dans la littérature (*J. Med. Chem.* 2000, 43, 4701).

Un autre objet de l'invention concerne les composés de formule générale (III)




dans laquelle

X représente un atome d'hydrogène ou d'halogène,

R_1 représente un atome d'hydrogène ou un groupe $(\text{C}_1\text{-C}_4)$ alkyle,

R' et R'' représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un groupe $(\text{C}_1\text{-C}_4)$ alkyle, utiles en tant qu'intermédiaires de synthèse pour la préparation des composés de formule générale (I).

Un autre objet de l'invention concerne les composés de formule générale (IV)



dans laquelle

X représente un atome d'hydrogène ou d'halogène,


R₁ représente un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle,

5 R' représente un groupe (C₁-C₄)alkyle,

R₂ et R₃ représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle, ou bien R₂ et R₃ forment, avec l'atome d'azote qui les porte, un groupe pyrrolidinyle, pipéridinyle, morpholinyle ou 4-(C₁-C₄)alkylpipérazinyle,

10 utiles en tant qu'intermédiaires de synthèse pour la préparation des composés de formule générale (I).

Un autre objet de l'invention concerne les composés de formule générale (V)



dans laquelle

X représente un atome d'hydrogène ou d'halogène,

15 R₁ représente un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle,

R₂ et R₃ représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle, ou bien R₂ et R₃ forment, avec l'atome d'azote qui les porte, un groupe pyrrolidinyle, pipéridinyle, morpholinyle ou 4-(C₁-C₄)alkylpipérazinyle, utiles en tant qu'intermédiaires de synthèse pour la préparation des composés de

20 formule générale (I).

Les exemples qui vont suivre illustrent la préparation de quelques composés de l'invention. Ces exemples ne sont pas limitatifs et ne font qu'illustrer l'invention. Les numéros des composés exemplifiés renvoient à ceux donnés dans le tableau ci-après, qui illustre les structures chimiques et les propriétés physiques de quelques composés

25 suivant l'invention. Les microanalyses élémentaires, et les spectres I.R. et R.M.N. confirment les structures des composés obtenus.

Exemple 1 (Composé N°1).

7-fluoro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(pyridin-2-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acétamide

5

1.1. 6-fluoro-1-méthyl-1*H*-indole-2-carboxylate de méthyle

On agite pendant 2 h à température ambiante une suspension de 7,9 g (197 mmol) d'hydrure de sodium à 60% (préalablement lavé à l'éther de pétrole) et de 36,1 g (176 mmol) de 6-fluoro-1*H*-indole-2-carboxylate de méthyle (contenant 10 à 20% de 6-fluoro-1*H*-indole-2-carboxylate d'éthyle) dans 250 ml de *N,N*-diméthylformamide. On ajoute
10 ensuite 12 ml (193 mmol) de iodométhane dans 50 ml de *N,N*-diméthylformamide et on agite le mélange à température ambiante pendant 12 h.

On verse le contenu dans un mélange eau et glace. On additionne du dichlorométhane et on neutralise la phase aqueuse avec de l'acide chlorhydrique (1N). On décante la
15 phase organique, on la lave à l'eau, on la sèche sur sulfate de sodium, on filtre et on concentre sous pression réduite. On purifie le résidu par chromatographie sur colonne de gel de silice dans un mélange de solvants (cyclohexane/dichlorométhane : 50/50 à 0/100 puis dichlorométhane/acétate d'éthyle : 100/0 à 70/30).

On isole 32,7 g (170 mmol) d'un composé blanc de 6-fluoro-1-méthyl-1*H*-indole-2-
20 carboxylate de méthyle contenant 10 à 20% de 6-fluoro-1-méthyl-1*H*-indole-2-carboxylate d'éthyle.

1.2. 3-[6-fluoro-2-(méthoxycarbonyl)-1-méthyl-1*H*-indol-3-yl]-3-oxopropanoate de méthyle

25 On ajoute par portions 6,5 ml (60 mmol) de 3-chloro-3-oxopropanoate de méthyle à une solution de 6,6 ml (60 mmol) de tétrachlorure de titane dans 80 ml de 1,2-dichloroéthane. On agite pendant 30 min à température ambiante. On ajoute une solution de 5 g (24,1 mmol) de 6-fluoro-1-méthyl-1*H*-indole-2-carboxylate de méthyle (contenant 10 à 20% de 6-fluoro-1-méthyl-1*H*-indole-2-carboxylate d'éthyle), obtenu à
30 l'étape 1.1., et on agite pendant 20 h à 40°C. On verse le mélange dans de l'eau glacée et on extrait au dichlorométhane. On décante la phase organique, on la lave à l'eau, on la sèche sur sulfate de sodium, on filtre et on concentre sous pression réduite. On purifie le résidu par chromatographie sur colonne de gel de silice (éluant : cyclohexane/dichlorométhane: 90/10 à 0/100 puis dichlorométhane/acétate d'éthyle:
35 100/0 à 50/50).

On obtient 13 g d'un solide pâteux contenant majoritairement le composé. Il est engagé tel que dans la suite de la synthèse.

1.3. *N,N*-diméthyl-3-[6-fluoro-2-(méthoxycarbonyl)-1-méthyl-1*H*-indol-3-yl]-3-oxopropanamide

On fait passer un courant de diméthylamine gazeuze dans un mélange de 13 g (44,4 mmol) de 3-[6-fluoro-2-(méthoxycarbonyl)-1-méthyl-1*H*-indol-3-yl]-3-oxopropanoate de méthyle, obtenu à l'étape 1.2., et de 0,2 g (1,63 mmol) de 4-(*N,N*-diméthyl)aminopyridine dans 80 ml de toluène. On adapte aussitôt un réfrigérant surmonté d'un ballon de baudruche et on agite la solution à 100°C durant 20 h. On refroidit le mélange à température ambiante, on concentre sous pression réduite. On ajoute 200 ml de dichlorométhane, de l'eau et de l'acide chlorhydrique (1N). On décante la phase organique, on la lave à l'eau, on la sèche sur sulfate de sodium, on filtre et on concentre sous pression réduite. On purifie le résidu par chromatographie sur colonne de gel de silice (éluant : cyclohexane/dichlorométhane : 50/50, puis dichlorométhane/acétate d'éthyle : 100/0 à 0/100).

On isole 4,6 g (14 mmol) d'un solide jaune engagé tel quel dans la suite de la synthèse.

1.4. 7-fluoro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(pyrid-2-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acétamide

On porte au reflux pendant 22 h une solution de 1,4 g (4,1 mmol) de *N,N*-diméthyl-3-[6-fluoro-2-(méthoxycarbonyl)-1-méthyl-1*H*-indol-3-yl]-3-oxopropanamide, obtenu à l'étape 1.3., dans 40 ml d'éthanol absolu, avec quelques gouttes d'acide acétique glacial et 1,4 g (12,8 mmol) de 2-pyridylhydrazine.

On refroidit le milieu et on concentre sous pression réduite. On ajoute de l'eau et 200 ml de dichlorométhane. On ajoute une solution de soude jusqu'à pH > 10. On décante la phase organique, on la lave à l'eau, on la sèche sur sulfate de sodium, on filtre et on concentre sous pression réduite. On purifie le résidu par chromatographie sur colonne de gel de silice dans un mélange de solvants (dichlorométhane/acétate d'éthyle : 100/0 à 0/100, puis acétate d'éthyle/méthanol : 100/0 à 90/10). Le produit obtenu est ensuite chromatographié sur colonne d'alumine neutre dans un mélange de solvants (dichlorométhane/acétate d'éthyle : 100/0 à 0/100, puis acétate d'éthyle/méthanol : 100/0 à 90/10). On obtient un solide qui est rincé avec de l'éther diéthylique.

On isole 0,25 g (0,66 mmol) de composé sous forme d'un solide blanc.

Point de fusion : 222 - 223°C ; M+H⁺ : 380.

Exemple 2 (Composé N°6).

35 chlorhydrate de 7-chloro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(pyridin-3-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acétamide

2.1. 3-[6-chloro-2-(méthoxycarbonyl)-1-méthyl-1*H*-indol-3-yl]-3-oxopropanoate d'éthyle

On refroidit à 0°C une solution de 6,2 ml (48,4 mmol) de 3-chloro-3-oxopropanoate d'éthyle dans 70 ml de 1,2-dichloroéthane. On ajoute par petites portions 5,3 ml (48,3 mmol) de tétrachlorure de titane et on agite pendant 30 min à 0°C. On ajoute une solution de 4,3 g (19,2 mmol) de 6-chloro-1-méthyl-1*H*-indole-2-carboxylate de méthyle dans 35 ml de 1,2-dichloroéthane et on agite pendant 12 h à température ambiante. On verse le mélange dans de l'eau glacée et on extrait au dichlorométhane. On décante la phase organique, on la lave à l'eau, on la sèche sur sulfate de sodium, on filtre et on concentre sous pression réduite. On purifie le résidu par chromatographie sur colonne de gel de silice (éluant : cyclohexane/acétate d'éthyle: 90/10 à 80/20). On obtient un solide jaune que l'on triture dans de l'heptane puis dans de l'éther diisopropylique. On récupère 2,84 g (8,4 mmol) de composé sous forme d'un solide couleur crème.

2.2. 3-[6-chloro-2-(méthoxycarbonyl)-1-méthyl-1*H*-indol-3-yl]-*N,N*-diméthyl-3-oxopropanamide

On fait passer un courant de diméthylamine gazeuse dans un mélange de 15 g (44,4 mmol) de 3-[6-chloro-2-(méthoxycarbonyl)-1-méthyl-1*H*-indol-3-yl]-3-oxopropanoate d'éthyle, obtenu à l'étape 2.1., et de 0,2 g (1,63 mmol) de 4-(*N,N*-diméthyl)aminopyridine dans 100 ml de toluène. On adapte aussitôt un réfrigérant surmonté d'un ballon de boudin et on agite la solution à 100°C sous faible pression durant 20 h. On refroidit le mélange à température ambiante, on concentre sous pression réduite et on chromatographie le résidu sur colonne de gel de silice (éluant : cyclohexane/dichlorométhane : 50/50, puis dichlorométhane/acétate d'éthyle: 100/0 à 0/100). On obtient 3,8 g d'un solide jaune que l'on recristallise dans un mélange dichlorométhane/acétate d'éthyle. On isole 1,8 g (5,3 mmol) d'un solide blanc-jaune.

2.3. 7-chloro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acétamide

On porte à 90°C pendant 24 h une solution de 1,7 g (5,2 mmol) de 3-[6-chloro-2-(méthoxycarbonyl)-1-méthyl-1*H*-indol-3-yl]-*N,N*-diméthyl-3-oxopropanamide, obtenu à l'étape 2.2., dans 150 ml de toluène, en présence de 1,8 ml (36,8 mmol) d'hydrazine monohydrate et d'une quantité catalytique d'acide *p*-toluènesulfonique. On refroidit le milieu, on recueille un insoluble par filtration, on le lave avec de l'eau, puis de l'éther diisopropylique et on le sèche sous pression réduite. On isole 1,70 g (5,2 mmol) de composé sous forme d'un solide blanc. Point de fusion : > 300°C.

2.4. chlorhydrate de 7-chloro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(pyridin-3-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acétamide

On solubilise 0,2 g (0,63 mmol) de 7-chloro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acétamide, obtenu à l'étape 2.3., dans 15 ml de *N*-méthylpyrrolidone. A température ambiante et sous atmosphère d'argon, on introduit 0,11 ml (1,4 mmol) de pyridine, 0,19 ml (1,4 mmol) de triéthylamine, 1 g de tamis moléculaire, 0,24 g (1,3 mmol) d'acétate cuivrique et 0,22 g (1,4 mmol) de 2-(pyridin-3-yl)-1,3,2-dioxaborinane. Après 24 h de réaction, on élimine les insolubles par filtration et on ajoute à la solution 0,11 ml (1,4 mmol) de pyridine, 0,19 ml (1,4 mmol) de triéthylamine, 1 g de tamis moléculaire, 0,24 g (1,3 mmol) d'acétate cuivrique et 0,22 g (1,4 mmol) de 2-(pyridin-3-yl)-1,3,2-dioxaborinane. On agite la réaction pendant 24 h supplémentaires. On élimine les insolubles par filtration et on concentre sous pression réduite pour éliminer le solvant. On ajoute du dichlorométhane et de l'eau. On extrait la phase aqueuse au dichlorométhane. On réunit les phases organiques et on les lave à l'eau. On sèche sur sulfate de sodium, on filtre et on concentre sous pression réduite. On purifie le résidu par chromatographie sur colonne de gel de silice (éluant : dichlorométhane, puis acétate d'éthyle/méthanol: 100/0 à 80/20). On obtient un solide que l'on dissout dans un mélange dichlorométhane/méthanol. On ajoute de l'acétate d'éthyle et on concentre partiellement le mélange. On isole un solide par filtration que l'on recristallise dans un mélange d'éthanol et de dichlorométhane. On récupère 110 mg de 7-chloro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(pyridin-3-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acétamide (composé n°5) sous forme d'un solide blanc.

Point de fusion : 255 – 256°C.

On forme le chlorhydrate par dissolution du solide isolé ci-dessus dans un mélange de méthanol et de dichlorométhane et par ajout d'une solution 5N d'acide chlorhydrique dans du propan-2-ol. Après recristallisation dans de l'éthanol, on isole 0,09 g (0,20 mmol) de composé sous forme de solide blanc.

Point de fusion : 250 – 252°C; M+H⁺ : 396.

30 Exemple 3 (Composé N°10).

Chlorhydrate de 4-méthyl-1-[2-[7-chloro-5-méthyl-4-oxo-3-(pyridin-3-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indol-1-yl]acet-1-yl]pipérazine (1:1)

3.1. [3-[6-chloro-2-(méthoxycarbonyl)-1-méthyl-1*H*-indol-3-yl]3-oxopropion-1-yl]4-méthylpipérazine

On porte au reflux pendant 12 h une solution de 2,84 g (8,4 mmol) de 3-[6-chloro-2-(méthoxycarbonyl)-1-méthyl-1*H*-indol-3-yl]-3-oxopropanoate d'éthyle, obtenu à l'étape 2.1. de l'exemple 2, dans 160 ml de toluène, en présence de 3,7 ml (34 mmol) de *N*-méthylpipérazine et de 110 mg (0,9 mmol) de 4-(*N,N*-diméthylamino)pyridine.

On refroidit le mélange à température ambiante. On ajoute 100 ml de dichlorométhane, 80 ml d'eau et 10 ml d'une solution aqueuse d'ammoniaque à 20%. On décante la phase organique, on extrait la phase aqueuse avec du dichlorométhane (2 fois 100 ml), on réunit les phases organiques. On lave à l'eau, on sèche sur sulfate de sodium, on filtre, on concentre sous pression réduite et on purifie le résidu par chromatographie sur colonne de gel de silice (éluant : dichlorométhane/méthanol : 100/0 à 90/10). On obtient 1,68 g (4,3 mmol) d'une huile jaune.

3.2. 4-Méthyl-1-[2-[7-chloro-5-méthyl-4-oxo-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indol-1-yl]acet-1-yl]pipérazine

On porte à 90°C pendant 24 h une solution de 1,68 g (4,3 mmol) de [3-[6-chloro-2-(méthoxycarbonyl)-1-méthyl-1*H*-indol-3-yl]3-oxopropion-1-yl]4-méthylpipérazine, obtenu à l'étape 3.1., dans 80 ml de toluène, en présence de 1,7 ml (35 mmol) d'hydrazine monohydrate et d'une quantité catalytique d'acide *p*-toluènesulfonique.

On refroidit le milieu, on recueille un insoluble par filtration, on le lave avec de l'eau, puis de l'éther diisopropylique et on le sèche sous pression réduite.

On isole 1,43 g (3,8 mmol) de composé sous forme d'un solide blanc.

Point de fusion : > 300°C.

3.3. Chlorhydrate de 4-méthyl-1-[2-[7-chloro-5-méthyl-4-oxo-3-(pyridin-3-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indol-1-yl]acet-1-yl]pipérazine (1:1)

On solubilise 0,45 g (1,2 mmol) de 4-méthyl-1-[2-[7-chloro-5-méthyl-4-oxo-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indol-1-yl]acet-1-yl]pipérazine, obtenu à l'étape 3.2., dans 30 ml de *N*-méthylpyrrolidone. A température ambiante et sous atmosphère d'argon, on introduit 0,2 ml (2,4 mmol) de pyridine, 0,34 ml (2,4 mmol) de triéthylamine, 0,30 g de tamis moléculaire, 0,44 g (2,4 mmol) d'acétate cuivrique et 0,39 g (2,4 mmol) de 2-(pyridin-3-yl)-1,3,2-dioxaborinane. Après 24 h de réaction, on élimine les insolubles par filtration et on ajoute à la solution 0,2 ml (2,4 mmol) de pyridine, 0,34 ml (2,4 mmol) de triéthylamine, 0,30 g de tamis moléculaire, 0,44 g (2,4 mmol) d'acétate cuivrique et 0,39 g (2,4 mmol) de 2-(pyridin-3-yl)-1,3,2-dioxaborinane. On agite la réaction pendant 24 h supplémentaires. On élimine les insolubles par filtration et on concentre sous pression réduite pour éliminer le solvant. On ajoute du dichlorométhane et de l'eau. On extrait la phase aqueuse au dichlorométhane. On réunit les phases organiques et on les lave à l'eau. On sèche sur sulfate de sodium et on concentre sous pression réduite. On purifie le résidu par chromatographie sur colonne de silice (éluant : dichlorométhane/méthanol: 100/0 à 90/10).

On récupère un solide blanc dont on forme le chlorhydrate par solubilisation dans un mélange de propan-2-ol et de méthanol et par ajout d'une solution 0,1 N d'acide

chlorhydrique dans le propan-2-ol. Après recristallisation dans un mélange de propan-2-ol et de méthanol, on isole 0,34 g (0,70 mmol) de composé sous forme de solide blanc. Point de fusion : 287°C (décomposition); $M+H^+$: 451.

5 Exemple 4 (Composé N°8).

7-chloro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3-(6-méthylpyridin-3-yl)-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acétamide

On solubilise 0,4 g (1,25 mmol) de 7-chloro-*N,N*,5-triméthyl-4-oxo-3,5-dihydro-4*H*-pyridazino[4,5-*b*]indole-1-acétamide, obtenu à l'étape 2.3. de l'exemple 2, dans 45 ml de
10 *N*-méthylpyrrolidone. A température ambiante et sous atmosphère d'argon, on introduit 0,2 ml (2,5 mmol) de pyridine, 0,35 ml (2,5 mmol) de triéthylamine, 0,40 g de tamis moléculaire, 0,45 g (2,5 mmol) d'acétate cuivrique et 0,80 g (3,6 mmol) de 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(6-méthylpyridin-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane. Après 24 h de réaction, on ajoute à la solution 0,2 ml (2,5 mmol) de pyridine, 0,35 ml (2,5 mmol) de triéthylamine,
15 0,40 g de tamis moléculaire, 0,45 g (2,5 mmol) d'acétate cuivrique et 0,80 g (3,6 mmol) de 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(6-méthylpyridin-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane. On agite la réaction pendant 24 h supplémentaires. On élimine les insolubles par filtration et on concentre le filtrat sous pression réduite pour éliminer le solvant. On ajoute du dichlorométhane et de l'eau. On extrait la phase aqueuse au dichlorométhane. On réunit les phases organiques
20 et on les lave à l'eau. On sèche sur sulfate de sodium, on filtre et on concentre sous pression réduite. On purifie le résidu par chromatographie sur colonne de gel de silice (éluant : dichlorométhane/méthanol: 100/0 à 80/20). On obtient un solide que l'on recristallise dans un mélange isopropanol/méthanol.


On isole 0,12 g (0,29 mmol) de composé sous forme de solide blanc.




25 Point de fusion : 253 – 255°C; $M+H^+$: 410.

Le tableau qui suit illustre les structures chimiques et les propriétés physiques de quelques composés de l'invention.

Dans la colonne "Sel" de ces tableaux, "HCl" désigne un chlorhydrate, "-" désigne un composé à l'état de base. Les rapports molaires acide : base sont indiqués en regard.
30 L'abréviation dec. signifie qu'à la température donnée, le solide est à l'état de décomposition.

Tableau



N° composé	X	R ₁	NR ₂ R ₃	Het	Sel	P.F. (°C)
1	F	CH ₃	N(CH ₃) ₂	pyridin-2-yl	-	222 – 223
2	F	CH ₃	N(CH ₃) ₂	pyridin-3-yl	HCl 1:1	244 – 250
3	F	CH ₃	N(CH ₃) ₂	pyridin-4-yl	HCl 1:1	267 – 270
4	Cl	CH ₃	N(CH ₃) ₂	pyridin-2-yl	-	183 – 184
5	Cl	CH ₃	N(CH ₃) ₂	pyridin-3-yl	-	255 – 256
6	Cl	CH ₃	N(CH ₃) ₂	pyridin-3-yl	HCl 1:1	250 – 252
7	Cl	CH ₃	N(CH ₃) ₂	pyridin-4-yl	HCl 1:1	275 – 279
8	Cl	CH ₃	N(CH ₃) ₂	6-méthylpyridin-3-yl	-	253 – 255
9	Cl	CH ₃	N(CH ₂ CH ₃) ₂	pyridin-3-yl	-	199 – 200
10	Cl	CH ₃		pyridin-3-yl	HCl 1:1	287 (dec.)
11	Cl	CH ₃		pyridin-3-yl	-	267 – 268
12	Cl	CH ₃		pyridin-4-yl	HCl 1:1	248 – 251

Les composés de l'invention ont fait l'objet d'essais pharmacologiques qui ont mis en évidence leur intérêt comme substances à activités thérapeutiques.

Les composés de l'invention présentent également des caractéristiques de solubilité dans l'eau qui favorisent une bonne activité *in vivo*.

10 Etude de la liaison [³H]Ro5-4864 aux récepteurs de type périphérique aux benzodiazépines (sites p ou PBR).

L'affinité des composés de l'invention pour les sites p ou PBR (sites de liaison de type périphérique aux benzodiazépines) a été déterminée.

Les récepteurs sites p peuvent être marqués sélectivement dans des membranes de rein de rat incubées en présence de [3 H]Ro5-4864. Les composés de l'invention ont fait l'objet d'une étude *in vitro* quant à leur affinité pour ces récepteurs.

Les animaux utilisés sont des rats mâles Sprague Dawley (Iffa Credo) de 180 à 300 mg.

- 5 Après décapitation, le rein est prélevé et le tissu est homogénéisé à 4°C au moyen d'un homogénéiseur PolytronTM pendant 2 min à 6/10 de la vitesse maximale, dans 35 volumes de tampon phosphate Na₂HPO₄ 50 mM, à un pH ajusté à 7,5 avec du NaH₂PO₄. L'homogénat membranaire est filtré sur gaze et dilué 10 fois avec du tampon. Le [3 H]Ro5-4864 (Activité spécifique : 70-90 Ci/mmol ; New England Nuclear), à une
- 10 concentration de 0,5 nM, est incubé en présence de 100 µl de l'homogénat membranaire dans un volume final de 1 ml de tampon contenant le composé à tester.

Après une incubation de 3 h à 0°C, les membranes sont récupérées par filtration sur filtres Whatman GF/BTM lavés avec 2 fois 4,5 ml de tampon d'incubation froid (0°C). La quantité de radioactivité retenue par le filtre est mesurée par scintigraphie liquide.

- 15 Pour chaque concentration de composé étudié, le pourcentage d'inhibition de la liaison du [3 H]Ro5-4864, puis la concentration CI₅₀, concentration qui inhibe 50% de la liaison spécifique, sont déterminés.

Les CI₅₀ des meilleurs composés de l'invention présentent des valeurs allant de 1 nM à 200 nM.

- 20 Les composés de l'invention sont donc des ligands affins pour les récepteurs de type périphérique aux benzodiazépines.

Etude de l'activité neurotrophe.

Test de survie des motoneurones après section du nerf facial chez le rat âgé de 4 jours.

- 25 Après lésion du nerf facial chez le rat immature, les motoneurones du noyau facial subissent une mort neuronale par apoptose. L'évaluation de la survie neuronale est réalisée à l'aide de méthodes histologiques et comptage neuronal.

Des rats immatures de 4 jours sont anesthésiés au pentobarbital (3 mg/kg par voie i.p.).

Le nerf facial droit est dégagé et sectionné, à sa sortie du foramen stylomastoïdien.

- 30 Après le réveil, les rats sont remis avec leur mère et traités, pendant 7 jours, par une ou deux administrations quotidiennes, par voie orale ou intrapéritonéale, à des doses allant de 1 à 10 mg/kg.

7 jours après la lésion, les animaux sont décapités, et les cerveaux congelés dans l'isopentane à -40°C. Le noyau facial est coupé au cryostat, en sections de 10 µm, dans

- 35 sa totalité. Les motoneurones sont colorés au crésyl violet et comptés à l'aide du logiciel HistoTM (BiocomTM).

Dans ce modèle, les composés de l'invention augmentent la survie neuronale d'environ 10 à 30%.

Les résultats des essais montrent que les composés de l'invention favorisent la régénération nerveuse.

Les composés selon l'invention peuvent donc être utilisés pour la préparation de
5 médicaments.

Ainsi, selon un autre de ses aspects, l'invention a pour objet des médicaments qui comprennent un composé de formule (I), ou un sel d'addition de ce dernier à un acide pharmaceutiquement acceptable, ou encore un hydrate ou un solvat du composé de
10 formule (I).

Ces médicaments trouvent leur emploi en thérapeutique, notamment pour la prévention et/ou le traitement des neuropathies périphériques de différent types, comme les neuropathies traumatiques ou ischémiques, neuropathies infectieuses, alcooliques,
15 médicamenteuses ou génétiques, ainsi que des affections du motoneurone, telle que les amyotrophies spinales et la sclérose latérale amyotrophique. Ces médicaments trouveront également une application dans le traitement des maladies neurodégénératives du système nerveux central, soit de type aigu comme les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes crâniens et médullaires, soit de type
20 chronique comme les maladies auto-immunes (sclérose en plaques), la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et toute autre maladie dans laquelle l'administration de facteurs neurotrophes est censée avoir un effet thérapeutique.

Les composés selon l'invention peuvent aussi être utilisés dans les traitements de
25 l'insuffisance rénale aiguë ou chronique, de la glomérulonéphrite, de la néphropathie diabétique, de l'ischémie et de l'insuffisance cardiaques, de l'infarctus du myocarde, de l'ischémie des membres inférieurs, du vasospasme coronaire, de l'angine de poitrine, des pathologies associées aux valves cardiaques, des maladies cardiaques inflammatoires, des effets secondaires dus à des médicaments cardiotoxiques ou aux
30 suites d'une chirurgie cardiaque, de l'athérosclérose et de ses complications thrombo-emboliques, de la resténose, des rejets de greffes, des conditions liées à une prolifération ou une migration incorrectes des cellules musculaires lisses.

Par ailleurs, des données récentes de la littérature indiquent que le récepteur de type
35 périphérique aux benzodiazépines pourrait jouer un rôle fondamental dans la régulation de la prolifération cellulaire et les processus de cancérisation. D'une manière générale, et par comparaison avec des tissus normaux, une densité accrue de récepteurs de type périphérique aux benzodiazépines est observée dans différents types de tumeurs et cancers.

Dans les astrocytomes humains, le niveau d'expression du récepteur de type périphérique aux benzodiazépines est corrélé avec le degré de malignité de la tumeur, l'index de prolifération et la survie des patients. Dans les tumeurs cérébrales humaines, l'augmentation du nombre de récepteurs de type périphérique aux benzodiazépines est utilisée comme une indication diagnostique en imagerie médicale et comme cible thérapeutique pour des conjugués formés d'un ligand du récepteur de type périphériques aux benzodiazépines et d'une drogue cytostatique. Une densité élevée de récepteurs de type périphérique aux benzodiazépines est également observée dans les carcinomes ovariens et les cancers du sein. Concernant ces derniers, il a été démontré que le niveau d'expression des récepteurs de type périphérique aux benzodiazépines est relié au potentiel agressif de la tumeur ; de plus la présence d'un agoniste du récepteur de type périphérique aux benzodiazépines stimule la croissance d'une lignée de cancer mammaire.

L'ensemble de ces résultats, qui suggère une fonction délétère du récepteur de type périphérique aux benzodiazépines dans les processus de cancérisation, constitue une base pertinente pour la recherche de ligands synthétiques spécifiques du récepteur de type périphérique aux benzodiazépines capables d'en bloquer les effets.

Les composés peuvent donc être utilisés pour le traitement des tumeurs et cancers.

Les récepteurs de type périphérique aux benzodiazépines sont également présents au niveau de la peau et, à ce titre, les composés utilisables selon l'invention peuvent être utilisés pour la prophylaxie ou le traitement des stress cutanés.

Par stress cutané, on entend les différentes situations qui pourraient provoquer des dommages en particulier au niveau de l'épiderme, quel que soit l'agent qui provoque ce stress. Cet agent peut être interne et/ou externe à l'organisme, comme un agent chimique ou radicalaire, ou bien externe, comme un rayonnement ultraviolet.

Ainsi les composés utilisables selon l'invention sont destinés à prévenir et à lutter contre les irritations cutanées, les dartres, les érythèmes, les sensations dysesthésiques, les sensations d'échauffement, les prurits de la peau et/ou des muqueuses, le vieillissement et peuvent aussi être utilisés dans les désordres cutanés tels que, par exemple, le psoriasis, les maladies prurigineuses, l'herpès, les photodermatoses, les dermatites atopiques, les dermatites de contact, les lichens, les prurigos, les piqûres d'insectes, dans les fibroses et autres troubles de la maturation des collagènes, dans les désordres immunologiques ou encore dans des affections dermatologiques comme l'eczéma.

Les composés de l'invention peuvent également être utilisés pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires chroniques, notamment la polyarthrite rhumatoïde.

- 5 Selon un autre de ses aspects, l'invention a pour objet des compositions pharmaceutiques comprenant, en tant que principe actif, au moins un composé de formule générale (I). Ces compositions pharmaceutiques contiennent une dose efficace d'au moins un composé de l'invention, à l'état de base, de sel pharmaceutiquement acceptable, de solvat ou d'hydrate, et éventuellement associé à au moins un excipient
- 10 pharmaceutiquement acceptable.

Lesdits excipients sont choisis selon la forme pharmaceutique et le mode d'administration souhaité, parmi les excipients habituels qui sont connus de l'Homme du métier.

- 15 Dans les compositions pharmaceutiques de l'invention pour l'administration orale, sublinguale, sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, topique, locale, intratrachéale, intranasale, transdermique, rectale, intraoculaire, le principe actif de formule générale (I) ci-dessus, ou son sel, solvat ou hydrate éventuel, peut être administré sous forme unitaire d'administration, en mélange avec au moins un excipient
- 20 pharmaceutique classique, aux animaux et aux êtres humains pour la prophylaxie ou le traitement des troubles et des maladies ci-dessus.

- Les formes unitaires d'administration peuvent être, par exemple, des comprimés, des gélules, des granules, des poudres, des solutions ou suspensions orales ou injectables,
- 25 des timbres transdermiques ("patch"), des formes d'administration sublinguale, buccale, intratrachéale, intraoculaire, intranasale, par inhalation, des formes d'administration topique, transdermique, sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse, des formes d'administration rectale ou des implants. Pour l'administration topique on peut envisager des crèmes, gels, pommades, lotions ou collyres.

- 30 Ces formes galéniques sont préparées selon les méthodes usuelles des domaines considérés.

Lesdites formes unitaires sont dosées pour permettre une administration journalière de 0,001 à 20 mg de principe actif par kg de poids corporel, selon la forme galénique.


35

Il peut y avoir des cas particuliers où des dosages plus élevés ou plus faibles sont appropriés ; de tels dosages ne sortent pas du cadre de l'invention. Selon la pratique habituelle, le dosage approprié à chaque patient est déterminé par le médecin selon le mode d'administration, le poids et la réponse dudit patient.

La présente invention, selon un autre de ses aspects, concerne également une méthode de traitement des pathologies ci-dessus indiquées qui comprend l'administration, à un patient, d'une dose efficace d'un composé selon l'invention, ou un de ses sels
5 pharmaceutiquement acceptables ou hydrates ou solvats.

Revendications

1. Composé répondant à la formule générale (I)



dans laquelle

5 X représente un atome d'hydrogène ou d'halogène,

R_1 représente un atome d'hydrogène ou un groupe (C_1-C_4) alkyle,

R_2 et R_3 représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C_1-C_4) alkyle, ou bien R_2 et R_3 forment, avec l'atome d'azote qui les porte, un groupe pyrrolidinyle, pipéridinyle, morpholinyle ou 4- (C_1-C_4) alkylpipérazinyle, et

10 Het représente un groupe hétéroaromatique de type pyridinyle, quinolinyle, isoquinolinyle, pyrimidinyle, pyrazinyle, pyridazinyle, le groupe hétéroaromatique pouvant porter un ou plusieurs atomes d'halogènes et/ou un ou plusieurs groupes (C_1-C_4) alkyle, (C_1-C_4) alcoyle,

à l'état de base ou de sel d'addition à des acides, ainsi qu'à l'état d'hydrate ou de solvat.

15

2. Composé selon la revendication 1, caractérisé en ce que X représente un atome d'halogène.

3. Composé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que R_1 représente un (C_1-C_4) alkyle.

4. Composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que R_2 et R_3 représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un groupe (C_1-C_4) alkyle, ou bien R_2 et R_3 forment, avec l'atome d'azote qui les porte, un groupe pyrrolidinyle, ou 4- (C_1-C_4) alkylpipérazinyle.


25

5. Composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que Het représente un groupe hétéroaromatique de type pyridinyle pouvant porter un ou plusieurs atomes d'halogène et/ou un ou plusieurs groupes (C_1-C_4) alkyle,

30 (C_1-C_4) alcoyle.

6. Composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que X représente un atome de chlore et R₁ représente un groupe méthyle.

7. Procédé de préparation d'un composé de formule générale (I),



5 dans laquelle

X représente un atome d'hydrogène ou d'halogène,


R₁ représente un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle,

R₂ et R₃ représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle, ou bien R₂ et R₃ forment, avec l'atome d'azote qui les porte, un

10 groupe pyrrolidinyle, pipéridinyle, morpholinyle ou 4-(C₁-C₄)alkylpipérazinyle, et

Het représente un groupe hétéroaromatique de type pyridinyle, quinolinyle, isoquinolinyle, pyrimidinyle, pyrazinyle, pyridazinyle, le groupe hétéroaromatique pouvant porter un ou plusieurs atomes d'halogènes et/ou un ou plusieurs groupes (C₁-C₄)alkyle, (C₁-C₄)alcoyle,

15 caractérisé en ce que l'on fait réagir le composé de formule générale (IV)



dans laquelle


X, R₁, R₂ et R₃ sont tels que définis ci-dessus,

R' représente un groupe (C₁-C₄)alkyle,

dans un solvant polaire en présence d'acide, avec une hétéroarylhiazine.

20


8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que le composé de formule générale (IV),



dans laquelle

X, R₁, R₂, R₃ et R' sont tels que définis ci-dessus,

est préparé en faisant réagir un composé de formule générale (III),



5 dans laquelle


X, R₁ et R' sont tels que définis ci-dessus,

R'' représente un groupe (C₁-C₄)alkyle,

avec une amine de formule générale HNR₂R₃, dans laquelle R₂ et R₃ sont tels que définis ci-dessus, en présence d'un catalyseur comme la 4-(diméthylamino)pyridine.

10

9. Procédé de préparation d'un composé de formule générale (I),



dans laquelle

X représente un atome d'hydrogène ou d'halogène,


R₁ représente un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle,

15 R₂ et R₃ représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle, ou bien R₂ et R₃ forment, avec l'atome d'azote qui les porte, un groupe pyrrolidinyle, pipéridinyle, morpholinyle ou 4-(C₁-C₄)alkylpipérazinyle, et

Het représente un groupe hétéroaromatique de type pyridinyle, quinolinyle, isoquinolinyle, pyrimidinyle, pyrazinyle, pyridazinyle, le groupe hétéroaromatique pouvant

20 porter un ou plusieurs atomes d'halogènes et/ou un ou plusieurs groupes (C₁-C₄)alkyle, (C₁-C₄)alcoxyle,

comprenant l'étape consistant à
réaliser une réaction de N-hétéroarylation sur un composé de formule générale (V)




dans laquelle

X, R₁, R₂ et R₃ sont tels que définis ci-dessus,

- 5 en présence d'un halogénure d'hétéroaryle, ou bien d'un dérivé d'acide hétéroarylboronique et d'un sel métallique tel que un sel de cuivre.


10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que composé de formule générale (V),



10 dans laquelle

X, R₁, R₂ et R₃ sont tels que définis ci-dessus,

est préparé en faisant réagir un composé de formule générale (IV),




dans laquelle

X, R₁, R₂, R₃ sont tels que définis ci-dessus,

- 15 R' représente un groupe (C₁-C₄)alkyle,
avec de l'hydrazine en chauffant dans un solvant comme le toluène en présence d'une quantité catalytique d'acide.

11. Composé répondant à la formule générale (III)




dans laquelle

X représente un atome d'hydrogène ou d'halogène,

R₁ représente un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle,

5 R' et R'' représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un groupe (C₁-C₄)alkyle.

12. Composé répondant à la formule générale (IV)



dans laquelle

X représente un atome d'hydrogène ou d'halogène,


10 R₁ représente un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle,

R' représente un groupe (C₁-C₄)alkyle,

R₂ et R₃ représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle, ou bien R₂ et R₃ forment, avec l'atome d'azote qui les porte, un groupe pyrrolidinyle, pipéridinyle, morpholinyle ou 4-(C₁-C₄)alkylpipérazinyle.

15

13. Composé répondant à la formule générale (V)



dans laquelle

X représente un atome d'hydrogène ou d'halogène,

R₁ représente un atome d'hydrogène ou un groupe (C₁-C₄)alkyle,

R_2 et R_3 représentent chacun, indépendamment l'un de l'autre, un atome d'hydrogène ou un groupe (C_1-C_4) alkyle, ou bien R_2 et R_3 forment, avec l'atome d'azote qui les porte, un groupe pyrrolidinyle, pipéridinyle, morpholinyle ou 4- (C_1-C_4) alkylpipérazinyle.

5 14. Composé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, ou sel pharmaceutiquement acceptable de ce dernier, ou hydrate ou solvat dudit composé, pour son utilisation comme médicament.

10 15. Composition pharmaceutique, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un composé de formule (I) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, ou un sel pharmaceutiquement acceptable, un hydrate ou un solvat de ce composé, éventuellement associé à au moins un excipient pharmaceutiquement acceptable.

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08


Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 2.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		SSL0065/JL	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		620418	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Dérivés de 3-hétéroaryl-3,5-dihydro-4-oxo-4H-pyridazino[4,5-b]indole-1-acétamide, Leur Préparation et Leur Application en Thérapeutique			
LE(S) DEMANDEUR(S) : SANOFI-SYNTHELABO 174, avenue de France 75013 Paris			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		FROISSANT	
Prénoms		Jacques	
Adresse	Rue	Cidex 981 BREVAINVILLE	
	Code postal et ville	41160	MOREE
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		MARABOUT	
Prénoms		Benoît	
Adresse	Rue	21 Rue Marie Curie	
	Code postal et ville	91380	CHILLY-MAZARIN
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		MARGUET	
Prénoms		Frank	
Adresse	Rue	17 Rue Paul Doumer	
	Code postal et ville	91370	VERRIERES-LE-BUISSON
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) 3 avril 2002 Jacques LUDWIG PG 9395			

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2. / 2..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260699

Vos références pour ce dossier (facultatif)		SSL0065/JL	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0204158	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Dérivés de 3-hétéroaryl-3,5-dihydro-4-oxo-4H-pyridazino[4,5-b]indole-1-acétamide, Leur Préparation et Leur Application en Thérapeutique			
LE(S) DEMANDEUR(S) : SANOFI-SYNTHELABO 174, avenue de France 75013 Paris			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		FUECH	
Prénoms		Frédéric	
Adresse	Rue	3 Allée d'Auvergne	
	Code postal et ville	78170	LA CELLE ST CLOUD
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) 3 avril 2002 Jacques LUDWIG PG 9395		